

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-6-66 517872

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire

67 STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

14 Juin 1966

Supplément n° 2 au Bulletin du mois de Juin 1966

Avertissement

V I G N E

(Secteurs soumis aux récents orages)

MILDIOU

Les précipitations importantes enregistrées à l'occasion des orages survenus ces jours derniers dans différentes localités du vignoble ont, en partie, lessivé le dernier traitement.

Compte tenu de cette situation, il y a lieu de renouveler la protection fongicide dès réception du présent avis.

Ces instructions sont également valables pour les secteurs grêlés où il est indispensable d'exécuter un traitement dans les meilleurs délais, de façon à favoriser la cicatrisation des plaies tout en limitant les risques d'extension du Mildiou en cette période très critique.

Les produits cupriques sont à éviter durant la floraison.

OIDIUM

Profiter d'une belle journée pour exécuter un soufrage soigné. Cette intervention efficace contre l'Oïdium favorisera la fécondation des fleurs.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES

La période des risques de contaminations primaires (contaminations par les ascospores) est terminée.

Dans les vergers correctement entretenus, indemnes de Tavelures, on peut, dès maintenant, arrêter les traitements contre ces maladies.

.../...

3/2

Par contre, dans les vergers où, pour une raison quelconque, la Tavelure est présente, tant sur feuilles que sur fruits, il est nécessaire de poursuivre les traitements à une cadence variable selon les conditions météorologiques (on pourra intervenir au rythme d'une application tous les 15 à 21 jours et cela jusqu'à la récolte).

Cette protection permanente permettra de limiter le développement ultérieur de la maladie à partir des spores (conidies d'été) issues des taches existantes.

POMMES DE TERRE

MILDIOU - DORYPHORES

Compte tenu des conditions actuelles favorables au développement du Mildiou, il y a lieu d'exécuter un traitement fongicide dans les cultures de variétés sensibles.

On interviendra dans les conditions suivantes :

Dans le secteur irrigué de la HARDT (cultures de primeurs) Réaliser une deuxième application dès réception.

En plaine un premier traitement devra être exécuté avant le 18 Juin.

Dans les secteurs montagneux (VOSGES en particulier) cette application pourra être différée d'une huitaine de jours.

Surveiller les cultures de façon à reconnaître la présence de larves de Doryphores dont les pullulations sont très inégales. On interviendra lorsque les larves auront atteint la grosseur d'un grain de blé.

Pour le choix de l'insecticide, se reporter à la liste en votre possession.

HOUBLON

MILDIOU

Le temps perturbé qui sévit sur notre région est susceptible de favoriser l'extension de la maladie. Une nouvelle application fongicide devra être exécutée dès réception.

PUCERONS

Le cas échéant, ajouter un produit aphicide à la bouillie anti - Mildiou.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux
J. HARRANGER

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/ Directeur-Gérant : L. BOUYX.